Name	Prüfungsnummer
.....	.....
Vorname	Datum
.....	.....

Situation Teil 1

Sie arbeiten in einem Seniorenzentrum im zweiten Stock. Dort leben ältere Menschen, welche unterschiedliche Unterstützung zur Bewältigung ihres Alltages benötigen. Einige Bewohner und Bewohnerinnen sind selbständig, andere benötigen Hilfe. Auf dem zweiten Stock hat es Einer- und Doppelzimmer, insgesamt sind es 16 Personen. Die Mahlzeiten nehmen sie gemeinsam im Speisesaal ein. Auf der Etage befindet sich ein grosses Wohnzimmer, in dem sich die Pensionäre zum gemeinsamen Jassen und zum Austausch treffen, sowie das Stationszimmer.

Seit drei Jahren lebt Frau Weber in einem Einerzimmer im Seniorenzentrum. Sie ist 86 Jahre alt und seit vier Jahren verwitwet. Vor ihrem Eintritt in das Seniorenzentrum wohnte sie in einem Einfamilienhaus mit einem grossen Garten. Der Hauptgrund für ihren Eintritt in das Seniorenzentrum war das Bedürfnis nach vermehrtem sozialem Kontakt. Das Führen des Haushaltes und die Gartenarbeit bereiteten ihr zudem vermehrt Schwierigkeiten. Frau Weber hat eine Tochter, welche sie einmal wöchentlich besucht.

Frau Weber hat seit acht Jahren eine starke Seheinschränkung. Auf dem rechten Auge ist sie blind. Das linke Auge hat noch eine Sehfähigkeit von 20%. Sie trägt eine Brille.
Bis vor zwei Tagen war Frau Weber bei der Durchführung der Körperpflege und bei der Bewegung selbständig. Durch das Auftreten einer Pneumonie befindet sie sich in einem reduzierten Allgemeinzustand. Sie braucht in der Körperpflege Unterstützung. Frau Weber hat trockene Hautverhältnisse.

Aufgrund ihrer Pneumonie hustet Frau Weber stark. Zudem klagt sie über Dyspnoe und einen zähen Auswurf. Die Dyspnoe tritt bei kleinsten körperlichen Anstrengungen auf. Sie fühlt sich schnell sehr müde.

In der Nacht schläft sie wenig.

Sie sind heute zuständig für die Pflege und Betreuung von Frau Weber.

Medikamente	Morgens	Mittags	Abends	Nachts
Augmentin® 625mg Tablette (Antibiotikum)	1	1	1	
Fluimucil® 600mg Sachet (Sekretolyticum)	1	1	1	
Beloc ZOK® 25 mg Tablette (Antihypertensivum)	1			

Neben der medikamentösen Therapie inhaliert Frau Weber drei Mal täglich mit einer Bisolvon ® Lösung à 2 ml (Sekretolyticum)

Reserve:
Gabe von 2 l Sauerstoff bei einer Dyspnoe
Seresta ® 15 mg Tablette zum Schlafen